

UZASADNIENIE

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i jest wymieniony w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt* (Dz.U. 2020 r. poz. 1421). Kontynuacja realizacji poszukiwań padłych dzików na wskazanym w rozporządzeniu obszarze jest konieczna ze względu na nadal niekorzystną sytuację epizootyczną dotyczącą ASF na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększenie częstotliwości prowadzonych poszukiwań zwłok dzików lub ich szczątków związane jest ze stwierdzeniem w dniu 29 kwietnia 2022 roku ogniska Afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, w miejscowości Oblazy Ryterskie, gmina Rytro, powiat nowosądecki.

Z uwagi na opublikowane w dniu 13 maja 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/743 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wyznaczone zostały obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) obejmujące część obszaru województwa małopolskiego, w tym:

- obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska): powiat brzeski, powiat gorlicki, powiat proszowski, część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I, gminy Czorsztyn, Krościenko Zdrój, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim, powiat miejski Nowy Sącz, powiat tarnowski, powiat miejski Tarnów;
- obszar objęty ograniczeniami nr II (strefa różowa): gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim, gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim;

Na obszarze objętym ograniczeniami nr II (strefa różowa) zaistniała konieczność zwiększenia częstotliwości prowadzonych poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków, ponieważ zbieranie padłych dzików i ich utylizacja jest ważnym sposobem ograniczania szerzenia się choroby w środowisku.

Rezerwuarem ASF są dziki. Bardzo niebezpiecznym źródłem zakażeń są zwłoki padłych dzików udowodniono bowiem, iż czynnik zakaźny wywołujący afrykański pomór świń charakteryzuje się długą, nawet wielomiesięczną, przeżywalnością i aktywnością. W związku z powyższym zwłoki padłych dzików lub ich szczątki są szczególnie groźne i należy eliminować je ze środowiska.

Ponadto wystąpienie afrykańskiego pomoru świń powoduje ogromne straty gospodarcze związane z upadkami zwierząt, wysokimi kosztami zwalczania choroby, czy ograniczeniami w przemieszczaniu świń. W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, konieczne jest kontynuowanie prowadzenia poszukiwań padłych dzików oraz zmiana obowiązującego rozporządzenia Wojewody Małopolskiego.